

運動シミュレーション2

ロケットの逆噴射・雨粒の落下

早大本庄 情報科 飯島 涼



なぜプログラミングで運動？

- ゲームプログラミング

- 工学全般

- ドローン・車・航空機の自動運転の制御


- <https://www.youtube.com/watch?v=q4Ugu4iJukM>

<https://game.watch.impress.co.jp/docs/news/1274927.html>

- 車・航空機のシミュレーション（次回）


時間の幅を狭くする

- 最初の5時間で15km $\frac{15}{5} = 3$
- 次の5時間で 20km
- 次の5時間で 10km
- 次の5時間で 50km
- 次の5時間で 5km $\frac{5}{5} = 1$



時間の幅を狭くする

- 最初の1時間で2km $\frac{2}{1}$
- 次の1時間で 3km $\frac{3}{1}$
- 次の1時間で 3km $\frac{3}{1}$
- ...
-
- 次の1時間で 20km $\frac{20}{1}$
- 次の1時間で 2 km



Δt : 区切る時間の幅




$$\frac{100}{25}$$



$$\frac{15}{5}$$



$$\frac{3}{1}$$



速度とは

- 区切る時間幅 Δt が小さいほど、今この瞬間の速度が正確にわかる

Q: 区切る時間幅 Δt をかぎりなく小さくしていったらどうなる？


$$\frac{100}{25}$$



$$\frac{15}{5}$$



$$\frac{3}{1}$$



時刻 t での位置を、 $x(t)$ とすると、

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t+\Delta t) - x(t)}{\Delta t} = v(t)$$

瞬間速度 v (m/s)

区切る時刻 Δt を、限りなく小さくしたときの速さのこと

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t+\Delta t) - x(t)}{\Delta t} = x'(t)$$

公式の復習




初期位置を x_0 , 初速度を v_0 , 重力加速度を g としたとき, $x(t)$ は,

$$x(t) = \frac{1}{2}gt^2 + v_0t + x_0$$


$$v(t) = x'(t) = gt + v_0$$

物理の理論とプログラミングの違い

○ 物理 (理論)



○ プログラミング




Δt をある程度の小ささで妥協して、
運動の振る舞いを観測してみる


離散的なデータ

運動シミュレーションの基礎

○ 等速度運動



変数 v (固定値を代入)



変数 x (時間経過ごとに位置の変化を足していく) ⁹

プログラムと運動との対応

```
1 v0 = 10 #速度 v0 [m/s]
2 x0 = 0.0 # 位置 x0 [m]
3
4 t = 0.0 # 時間 t[s]
5 dt = 0.01 # 区切る時間の幅  $\Delta t$ 
6
7 TIME_END = 20
8
9 while int(t) < TIME_END:
10 ① t += dt      0.01秒ごとの経過
11 ② |
```


①

1回分の繰り返しを、 Δt 秒の時間経過とみなす

②

Δt 秒時間が経過するごとに、その位置をリストに記録していく

=> ストロボ写真



加速度 $a[m/s^2]$

- プログラミング用の定義: 単位時間あたりに, 速度に加える値のこと


$a[m/s^2]$: 1[s]あたり, $a[m/s]$ を速度に加える

例)

$5[m/s^2]$:


1[s]あたり, $5[m/s]$ を速度に加える

0.01[s] あたり, $0.01 \times 5 [m/s]$




運動シミュレーションの基礎

○ 等加速度運動



変数 a (固定値を代入)




変数 v (時間経過ごとに速度の変化を足していく)

シミュレーションまとめ

- オイラー法

- Δt ごとに時間を進めて、速度や位置を記録していくシミュレーション方法



○ 100

○ 99

○ 97

○ 92

なぜ公式をグラフ化しない？

- グラフ化するための式を手計算しなくてはいけない(本日の自由課題の例)
- そもそも式にするのが困難な運動がある
 - 運動に伴って、質量が変化する（雪だま）
 - 物体に加わるFの値が時間によって変化するもの（次回、ロケット噴射）
- 公式を知らなくても、どのようにふるまうのか知らなくても初期値がわかれば試せる。（本日）

本日の内容

- 小数の誤差についての補足（エラーの原因その3）

- 公式で表しにくい運動をシミュレーションする
 - ロケットの逆噴射

 - 雨粒の落下

参考資料




- 大重美幸、詳細！Python 3 入門ノート、ソーテック社、2017
- 小高知宏、Pythonによる数値計算とシミュレーション、オーム社、2018
- 藤原邦男、基礎物理学 I 物理学序論としての力学、東京大学出版会、1984
- 山本義隆、駿台受験シリーズ 新・物理入門 増補改訂版、駿台文庫、1987
- 今井 功ほか、セミナーライブラリー物理学=2 演習力学[新訂版]、サイエンス社、1981

float 型 (小数の型)


- int: 整数の型
 - 文字 => 整数への変換 int() 関数
- float: 小数の型
 - 文字 => 小数への変換 float() 関数
- String: 文字の型
 - 数字 => 文字への変換 str() 関数

物理の理論とプログラミングの違い

○ 物理 (理論)



○ プログラミング



Δt をある程度の小ささで妥協して、
運動の振る舞いを観測してみる


離散的なデータ

2進数


1	0	1	1
8 の 位	4 の 位	2 の 位	1 の 位

2進数の簡単数え方


1




2



3




4




例続き


5




6




7




8



9



10



Q: この後の指の折り方はどうなるだろうか?

Q: いくつまで数えられそうか?

Q: 指の折り方に規則性はあるか?

2進数の小数

0	0	1	1	.	1	0	1	0
8	4	2	1		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$
の	の	の	の		の	の	の	の
位	位	位	位		位	位	位	位



3 . 625

2進数の小数

コンピュータが普段していること

0	0	1	1	.	1	0	1	0
8	4	2	1		$1/2$	$1/4$	$1/8$	$1/16$
の	の	の	の		の	の	の	の
位	位	位	位		位	位	位	位



3.625

入力された10進数を2進数に変換してメモリに格納
=> $1/2^n$ の和でうまく表せない小数はどうなる？

小数と無限小数

- Python での小数の表し方

$$a \times 2^n$$

a: 1. XXXXXXXXXXXXの形で表記した二進数
n: 指数部

aとnをペアで保存して小数を表す

ex)

$$1.00 \times 2^2 = 1 \times 2^2 = 4$$

⇒ $1/2^n$ の和でうまく表せない小数はどうなる?

⇒ 近似するしかない

バグの原因 誤差

- 0.06 秒経過後に何か処理をしたい場合

```
1 t = 0.0
2
3 dt = 0.01
4
5 for i in range(50):
6     t += dt
7     print(t)
8
9     if (t == 0.06):
10        print("hit")
```

```
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.0600000000000000005
0.07
0.08
0.09
0.09999999999999999
0.10999999999999999
0.11999999999999998
0.12999999999999998
0.13999999999999999
```

改善案（本日使います）

- 意図的に結果を四捨五入する（切り捨てもOK）



```
1 t = 0.0
2
3 dt = 0.01
4
5 for i in range(50):
6     t += dt
7     print(t)
8
9     if (round(t, 2) == 0.06):
10         print(round(t, 2))
11         print("hit")
```

```
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06000000000000000005
0.06
hit
0.07
0.08
0.09
```

演習


- ロケットの逆噴射

- 初期速度 v_0 , 初期高度 x_0 , 逆噴射の開始時刻 t_f をユーザが指定して、ロケットの着陸シミュレーションを行う

逆噴射前 $t < t_f$



逆噴射開始後 $t > t_f$



演習のプログラム例

<https://colab.research.google.com/drive/1aS643l6jy8FU0j4OqSYqtEbKIZHI46DT?usp=sharing>

```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 # 9/17 用演習プログラム
3 import numpy as np
4 import matplotlib.pyplot as plt
5
6 # 定数
7 g = 9.8
8
9 # tf 秒後に逆噴射の加速度を返す関数
10
11 def retrofire(t, tf):
12     if t >= tf:
13         return -1.5 * g #重力の1.5倍の|加速度で逆噴射を行う（ロケットの重さは考えない）
14     else:
15         return 0.0;
16
17 t = 0.0 # 時刻t
18 dt = 0.01 # 時刻の刻み幅
19
20 # 係数の入力
21 v = float(input("初速度v0を入力してください:"))
22 x0 = float(input("初期高度x0を入力してください:"))
23 tf = float(input("開始時刻tfを入力してください:"))
24 x = x0 # 初期高度の設定
```

時間経過後に、逆噴射分の加速度を返す関数

続き (前回の復習+a)

```
27 tlist = [t]
28 xlist = [x]
29 # 自由落下の計算
30 while (x > 0) and (x <= x0):
31     t += dt                # 時刻の更新
32     # ここに記入          # 速度の計算
33     # ここに記入          # 位置の更新
34
35     tlist.append(t)
36     xlist.append(x)
37 # グラフの表示
38 plt.plot(tlist, xlist) # グラフをプロット
39 plt.show()
```


できたかなと思ったら

- $v_0 = 0$, $x_0 = 100$, $t_f = 2.62$ として、滑らかな高度のグラフが描かれるかどうか試してください
 - 自由落下と同様の軌道を描いた場合 => 着陸失敗
 - 初期高度 x_0 を超えてしまう場合 => 着陸できずに再び空へ飛び立ちます
- 上記の条件でうまくいったら、 t_f や v_0 などの値をいろいろ試して、どのような場合に着陸失敗するのか、空へ飛び立つのかを調べてみてください。

雨粒の運動

- 雨はどのようにして降ってくるのか？
 - 空で雨粒ができてから、重力で加速し続ける？
 - 何らかの力が働いて、遅くなる？
 - 何らかの力が働いて、一定になる？

雨粒にかかる力



Q: 加速度はどうなる？

運動方程式

$$ma = F$$

$$ma = mg - kv$$

$$a = g - \frac{k}{m}v$$

演習 シミュレーション

雨粒の重さ $m = 0.0000005$ [kg]

空気抵抗の定数 $k = 1.089 \times 10^{-5}$ [$kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-1}$]

重力加速度 $g = 9.8$ [$m \cdot s^{-2}$]

初期高度 $x_0 = 2000$ [m]

として、時間における雨水の速度の変化をグラフ化してください。

前回のプログラムを利用してください。

加速度の計算には、1ループ前の速度を利用可能であると仮定します。

ある程度たったら答えのグラフを見せます。

補足: 加速度の定義と, 微分積分の関係

$$a(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v(t+\Delta t) - v(t)}{\Delta t} = v'(t)$$

- 加速度も, 速度と同様の議論で上の式を導ける(p. 3-9). (興味があれば考えてみてください)

The diagram shows three equations stacked vertically: $x(t) = \frac{1}{2}gt^2 + v_0t + x_0$, $v(t) = x'(t) = gt + v_0$, and $a(t) = v'(t) = g$. On the left, a blue bracket labeled '†で微分' (differentiate with †) spans from the top equation to the bottom equation. On the right, a yellow bracket labeled '†で積分' (integrate with †) spans from the bottom equation to the top equation.


$$\begin{array}{l} x(t) = \frac{1}{2}gt^2 + v_0t + x_0 \\ v(t) = x'(t) = gt + v_0 \\ a(t) = v'(t) = g \end{array}$$

Q(最終課題用): 加速度から積分して導いた後, 積分定数をどのように計算すれば上の公式が導けるだろうか?(応用)


演習（応用）

- ロケットの逆噴射で作成したコードに、1つ前のページにならって高度 x を表す式を付け足し、シミュレーションで作られた軌道を再現するグラフを記述してください。（下の右側グラフが応用、やや難しいです。）

シミュレーションで作ったグラフ



公式に当てはめて作ったグラフ



自由課題（簡単なもの）

1. 等加速度運動の公式を描画するプログラムを作成してください。物理で習った式をそのまま使って出力すればOKです
2. 1のプログラムと、前回作ったシミュレーション上での等加速度運動の公式のグラフを比較して、一致することを確認してください。（初期条件はすべて揃えてください）
3. 万有引力 $F = \frac{G m_1 m_2}{r^2}$ の r の変化による推移を確かめるグラフ ($r - F$ グラフ) を作成してください
 1. $G = 6.674 \times 10^{-11}$, $m_1 = 1.5$, $m_2 = 0.5$ として確認してみてください。
 2. できたら m_1 , m_2 の値を変えて大きさを確認してみてください。
(地球とリンゴの重さ、地球と月の重さを調べてみるなど)